

Perbedaan Jarak Tanam Dengan Metode Longline Berbingkai Terhadap Pertumbuhan Rumput Laut (*Eucheuma spinosum*)

Fadhillah Sudrian Barnus¹, Indah Anggraini Yusanti^{1*}, dan Sofian¹

¹Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Palembang

Email : indahayusanti@gmail.com

ABSTRAK

Rumput Laut (*Eucheuma spinosum*) merupakan alga golongan coklat yang memiliki nilai ekonomis dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat pesisir di Indonesia. Jenis ini banyak dibudidayakan karena mudah dan murah serta prospek pasar yang cukup baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan harian dan pertumbuhan mutlak rumput laut dengan jarak tanam berbeda menggunakan metode long line berbingkai. Penelitian dilakukan selama 50 hari, menggunakan 3 perlakuan yaitu jarak tanam 20cm, 40cm dan 60cm serta pengulangan sebanyak 3 kali, dengan berat awal rumput laut berkisar 50 gram. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu pertumbuhan harian (DGR), pertumbuhan mutlak (AGR) dan parameter kualitas air. Hasil yang diperoleh untuk pertumbuhan harian dan pertumbuhan mutlak rumput laut tertinggi adalah perlakuan P3 dengan jarak tanam 60 Cm sebesar 6,36%/hari dan seberat 1053,9gr, dan kualitas air pada lokasi penelitian masih terbilang baik untuk pertumbuhan rumput laut (*Eucheuma spinosum*).

Kata kunci : Jarak Tanam, Metode Longline, Rumput Laut (*Eucheuma spinosum*),
Pertumbuhan.

ABSTRACT

Seaweed (*Eucheuma spinosum*) is a brown algae that has economic value and is widely cultivated by coastal communities in Indonesia. This species is widely cultivated because it is easy and cheap and the market prospects are quite good. This study aims to determine the daily growth and absolute growth of seaweed with different spacing using the long line framed method. The study was conducted for 50 days, using 3 treatments, namely 20cm, 40cm and 60cm spacing and repeated 3 times, with the initial weight of seaweed ranging from 50 grams. The data collected in this study are daily growth (DGR), absolute growth (AGR) and water quality parameters. The results obtained for daily growth and absolute growth of the highest seaweed were P3 treatment with a spacing of 60 cm of 6.36%/day and a weight of 1053.9gr, and the water quality at the study site was still fairly good for the growth of seaweed (*Eucheuma spinosum*).

Keyword : Planting Distance, Longline Method, Seaweed (*Eucheuma spinosum*), Growth Daily

PENDAHULUAN

Rumput laut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang perawakannya (habitusnya) relatif sulit dibedakan antara akar, batang dan daunnya, karena hampir sebagian tubuhnya disebut dengan talus. Rumput laut terdiri dari 3 (tiga) divisi utama berdasarkan kandungan pigmen yang dominan yaitu Rhodophyta (alga merah), Phaeophyta (alga coklat), dan Chlorophyta (alga hijau) (Indrawati et al., 2007 dalam Ferawati, et al, 2016).

Jenis rumput laut yang umum dibudidayakan oleh masyarakat adalah rumput laut *Eucheuma spinosum*. Menurut Farnani, et al (2011), *Eucheuma spinosum* merupakan algae makro bentik yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung agar-agar, kerajinan dan alginat. Bahan baku tersebut dimanfaatkan dalam industri tekstil, kosmetik, dan makanan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan rumput laut, mendorong untuk dilakukannya budidaya rumput laut secara intensif. Salah satu metode dalam budidaya rumput laut adalah metode long line berbingkai. Kelebihan metode ini menurut Soegiarto (2005) dalam Farnani, et al (2011) yaitu pertumbuhan *Eucheuma spinosum* lebih cepat dan lebih menghemat material. Selain itu budidaya *Eucheuma spinosum* dengan metode ini tidak tergantung pada substrat dasar perairan sehingga dimungkinkan *Eucheuma spinosum* ini terbebas dari hama yang hidup pada dasar perairan yang berlumpur dan berkarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan harian, pertumbuhan mutlak rumput laut dan kualitas air rumput laut *Eucheuma spinosum*, diharapkan dapat menjadi sumber data tambahan mengenai pengaruh jarak tanam rumput laut dalam

upaya budidaya rumput laut bagi masyarakat pesisir pantai.

METODE PENELITIAN


Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi timbangan digital, konstruksi berbingkai, pelampung, alat tulis, tali, stereofom, jangkar, botol plastic, karter, pH meter, refraktometer, sechidisk, sedangkan bahan yang digunakan adalah rumput laut (*Eucheuma spinosum*).

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan yaitu jarak tanam rumput laut (*Eucheuma spinosum*) 20cm, 40cm dan 60cm dengan ulangan sebanyak 3 kali. Berat awal rumput laut yang ditebar adalah 50gr. Peliharaan dilakukan selama 50 hari dan setiap 10 hari dilakukan sampling. Sampling rumput laut diambil sebanyak 30 % dari setiap perlakuan.

Bibit rumput laut yang digunakan berumur 25 – 30 hari, memiliki cabang yang banyak, tidak terdapat bercak, tidak terdapat tumbuhan penempel dan bebas dari penyakit. Selanjutnya proses penanaman bibit dilakukan dengan mengikat bibit rumput laut pada tali jalur dengan jarak tanam sebesar 20 cm, 40 cm, 60 cm. Bibit diikat pada tali ris berukuran 1 mm dengan simpul hidup. Selanjutnya tali jalur diikat pada konstruksi dengan jarak 1m pada setiap jalur. Bibit rumput laut ditanam serentak dan merata untuk mengurangi stress pada rumput laut. Kemudian diberikan pelampung berupa botol air mineral pada

setiap jalur untuk mempertahankan kedalaman. Gambar

selengkapnya disajikan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Denah Jarak Tanam Rumput Laut Dengan Metode Longline Berbingkai

Pertumbuhan harian rumput laut dihitung mengacu pada Hendri, *et al* (2018).

Pertumbuhan mutlak rumput laut dihitung mengacu pada Hendri, *et al* (2018).

$$DGR = \left\{ \left[\frac{Wt}{Wo} \right]^{1/T} - 1 \right\} \times 100\%$$

$$AGR = Wt - Wo$$

Keterangan :

- DGR = pertumbuhan (%/hari)
- Wt = berat rumput laut pada akhir penelitian (g)
- Wo = berat rumput laut pada awal penelitian (g)
- T = waktu pengamatan (hari)

Keterangan :

- AGR = Pertumbuhan mutlak rumput laut (g)
- Wt = berat akhir bibit rumput laut (g)
- Wo = berat awal penanaman rumput laut (g)


Pengamatan kualitas air meliputi arus, suhu, kedalaman, kecerahan, salinitas, pH,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan harian dan mutlak rumput laut pada masing-masing perlakuan disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3 berikut ini.



Gambar 2. Pertumbuhan Harian Rumput Laut



Gambar 3. Pertumbuhan Mutlak Rumput Laut

Dari Gambar 2 dan Gambar 3 terlihat bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan pada rumput laut selama penelitian berlangsung. Pertumbuhan harian rumput laut tertinggi diperoleh pada perlakuan P3 sebesar 6,36 %/hari dan yang terendah pada perlakuan P1 sebesar 5,63%/hari, sedangkan pertumbuhan mutlak rumput laut tertinggi didapatkan pada perlakuan P3 sebesar

1053,9gr dan terendah pada perlakuan P1 sebesar 726,6gr. Berdasarkan hasil Ansira diketahui bahwa jarak tanam rumput laut berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan harian dan pertumbuhan mutlak rumput laut. Hal ini diduga karena adanya jarak tanam rumput laut yang menyebabkan thalus pada rumput laut mampu menyerap unsur hara lebih baik. Dugaan tersebut diperkuat oleh pendapat

Supit (1989) *dalam* Suswanto (2016) yang menyatakan bahwa persaingan antara thalussy dalam hal kebutuhan matahari, zat hara dan ruang gerak sangat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut. Lebih lanjut Ruswahyuni *et al.*, (1998) *dalam* Suswanto (2016); Farnani, *et al* (2011) menambahkan bahwa proses pertumbuhan rumput laut sangat tergantung pada salinitas, gelombang laut, kedalaman, kecepatan arus, intensitas

sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis, dimana melalui proses tersebut sel-sel rumput laut dapat menyerap unsur hara yang dapat memacu pertumbuhan harian rumput laut melalui aktifitas pembelahan sel.

Parameter kualitas perairan yang diukur pada penelitian ini meliputi arus, suhu, kedalaman, kecerahan, salinitas dan pH disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Kualitas Air Selama Penelitian

Minggu ke-	Parameter					
	Arus (cm/s)	Suhu (°C)	Kedalaman (m)	Kecerahan (m)	Salinitas	pH
1	25	29	19,1	8	32	8,24
3	30	29	18	9	28	8,64
5	27	29	19	8	30	8,33

Hasil pengukuran kecepatan arus pada lokasi penelitian berkisar antara 25 – 30 cm/s. Diduga nilai kecepatan arus tersebut termasuk dalam nilai optimum untuk budidaya rumput laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Arisandi dan Farid (2014) yang menyatakan bahwa arus yang baik untuk pertumbuhan rumput laut berkisar antara 20 – 40 cm/detik. Jika arus terlalu tinggi menyebabkan kerusakan pada rumput laut, sebaliknya jika arus terlalu rendah akan mengakibatkan nutrisi yang ada di perairan kurang baik. Fungsi arus dalam budidaya rumput laut salah satunya untuk mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan rumput laut dan membantu membersihkan kotoran yang menempel pada rumput laut.

Suhu pada lokasi penelitian diperoleh berkisar antara 28°C – 29°C. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa

lokasi sampling sesuai untuk pertumbuhan rumput laut. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hidayatulbaroroh (2020); Suswanto (2016) yang menyatakan bahwa suhu yang optimum untuk pertumbuhan rumput laut adalah 26-32°C. Adanya perubahan fluktuasi nilai suhu menurut Kordi (2000) *dalam* Ramadhan (2020) dipengaruhi oleh parameter lainnya, diantaranya musim, cuaca, waktu pengukuran, kedalaman air serta kecerahan suatu perairan. Lebih lanjut Tomascik *et al* (1997) *dalam* Susilowati *et al*, (2012) menambahkan bahwa suhu dapat mempengaruhi fotosintesis di laut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung yaitu suhu berperan untuk mengontrol reaksi enzimatik dalam proses fotosintesis. Suhu yang tinggi dapat menaikkan laju maksimum fotosintesis, sedangkan

pengaruh tidak langsung yaitu dalam merubah struktur hidrologi perairan yang dapat mempengaruhi distribusi fitoplankton.

Untuk pengukuran kedalaman perairan diperoleh nilai berkisar 18m - 19,1m. Nilai ini melebihi nilai optimum untuk budidaya rumput laut. Menurut Farid (2008) dalam Ferawati, *et al*, (2016), rumput laut di Indonesia akan tumbuh dengan baik pada kedalaman 20 – 30 cm, karena umumnya penetrasi cahaya matahari dapat mencapai kedalaman tersebut. Perairan yang terlalu dangkal akan menghambat pertumbuhan rumput laut, karena dekat dengan dasar perairan yang jika teraduk dapat menimbulkan kekeruhan sehingga mengganggu proses fotosintesis. Lebih lanjut Haris (2018) menambahkan bahwa perairan dengan kedalaman air yang terlalu dekat dengan dasar sangat rentan terhadap sedimentasi penumpukan kotoran dari sisa pakan dan hasil metabolisme ikan.

Pada pengukuran kecerahan diperoleh nilai berkisar antara 8m - 9m. Nilai kecerahan ini mengindikasikan bahwa lokasi budidaya rumput laut tersebut tergolong baik. Menurut Haris (2019), kecerahan berperan dalam menyediakan sinar matahari yang diperlukan oleh tumbuhan air dan fitoplankton dalam melakukan fotosintesis. Adanya variasi nilai kecerahan pada penelitian ini diduga dipengaruhi oleh kedalaman lokasi dan waktu sampling. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Akib *et al* (2015) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kecerahan di setiap lokasi pengambilan sampel berhubungan dengan kedalaman

lokasi, substansi sedimen, kecepatan arus dan waktu dilakukannya pengamatan.

Nilai salinitas pada lokasi penelitian berkisar antara 28 – 32 ppt. Nilai ini termasuk nilai salinitas yang optimal untuk budidaya atau pertumbuhan rumput laut. Menurut Ditjenkanbud (2005) dalam Susilowati (2012), kisaran salinitas yang baik untuk rumput laut adalah 28 – 35 ppt. Hasil pengukuran pH perairan pada lokasi penelitian berkisar antara 8,24 hingga 8,64. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada lokasi penelitian cocok untuk pertumbuhan rumput laut *Eucheuma spinosum*.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa pertumbuhan harian dan mutlak rumput laut (*Eucheuma spinosum*) tertinggi diperoleh pada perlakuan P3 (jarak tanam 60cm) sebesar 6,36 %/hari dan 1.053,9 gr, sedangkan nilai kualitas air yang diperoleh masih mendukung untuk pertumbuhan rumput laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, A., Litaay, M., Ambeng., dan Asnady, M. 2015. Kelayakan Kualitas Air Untuk Kawasan Budidaya *Eucheuma cottoni* Berdasarkan Aspek Fisika, Kimia Dan Biologi Di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*. Vol.1(1) : 25-36
- Arisandi, A., dan Farid, A. 2014. Dampak Faktor Ekologis terhadap Sebaran Penyakit Ice-ice. *Jurnal Kelautan*. Vol 7 (1) : 20-25.

- Farnani, Y.H., Cokrowati, N., dan Farida, N. 2011. Pengaruh Kedalaman Tanam Terhadap Pertumbuhan *Eucheuma spinosum* Pada Budidaya dengan Metode Rawai. *Jurnal Kelautan*. Vol.4(2) : 176-186
- Ferawati, E., Widyartini, D. S., dan Insan, I. 2014. Studi Komunitas Rumput Laut Pada Berbagai Substrat Di Perairan Pantai Permisian Kabupaten Cilacap. *Jurnal Scripta Biologica*. Vol.1(1) : 55-60
- Haris, R.B.K., dan Yusanti, I.A. 2018. Studi Parameter Fisika Kimia Air Untuk Keramba Jaring Apung Di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan*. Vol.14(2) : 57-62. DOI: <http://dx.doi.org/10.31851/jipbp.v13i2.2434>
- Haris, R.B.K., dan Yusanti, I.A. 2019. Analisis Kesesuaian Perairan Untuk Keramba Jaring Apung Di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Lahan Suboptimal*. Vol. 8 (1). Hlm : 20-30. DOI: <https://doi.org/10.33230/JLSO.8.1.2019.356>
- Hendri, M., Rozirwan., dan Handayani, Y. 2018. Untung Berlipat Dari Budidaya Rumput Laut Multi Manfaat. Lily Publisher. Yogyakarta. 180 Hal
- Hidayatulbaroroh, R. 2019. Teknik Dan Finansial Budidaya Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*) Dengan Metode Jalur Di Kelompok Tani Mitra Bahari Desa Tanjung Pademawu Pamekasan Madura. *Jurnal Vastuwidya*. Vol. 2(2) : 90-103
- Parenrengi, Andi, Rahman Syah dan Emma Suryati. 2012. Budi Daya Rumput laut Penghasil karaginan (Karaginofit). Badan Penelitian Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta
- Ramadhan, R., dan Yusanti, I.A. 2020. Studi Parameter Studi Kadar Nitrat Dan Fosfat Perairan Rawa Banjiran Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan*. Vol 15(1) : 37-41. DOI: <http://dx.doi.org/10.31851/jipbp.v15i1.4407>
- Susilowati, T., Rejeki, S., Dewi, E.N., dan Zulfetriani. 2012. Pengaruh Kedalaman Terhadap Pertumbuhan Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*) Yang Dibudidayakan Dengan Metode Longline Di Pantai Mlonggo, Kabupaten Jepara. *Jurnal Saintek Perikanan*. Vol. 8(1) : 1-6
- Suswantoro, A. 2016. Pertumbuhan dan Produksi Rumput Laut *Eucheuma spinosum* dengan Metode Tali Ganda Di Perairan Laguruda Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. 62 Hal